

NOM :  
PRENOM :

Date :  
Groupe :

## Mathématiques pour la Biologie (semestre 2) : Feuille-réponses du TD 2 Modèle dynamique pour deux espèces en compétition

Le système de Lotka-Volterra nous a permis de modéliser la dynamique de deux populations présentant une relation de type proies-prédateurs. Nous allons à présent modéliser la dynamique de *deux populations en compétition*, par exemple parce qu'elles partagent la même nourriture ou le même territoire. Notre objectif est d'étudier les possibilités de coexistence de ces deux populations. On choisit de faire les hypothèses suivantes :

- En l'absence de l'autre espèce, chacune des deux espèces suit un modèle logistique ( $x' = (\alpha_1 - \beta_1 x)x$  et  $y' = (\alpha_2 - \beta_2 y)y$ ).
- le taux de mortalité supplémentaire pour chacune des espèces dû à la présence de l'autre espèce est proportionnel à la fois à la taille de l'une et de l'autre des deux populations (et donc proportionnel à leur produit).

Sous ces hypothèses, le système peut s'écrire :


$$\begin{cases} x' &= (\alpha_1 - \beta_1 x - \gamma_{12}y)x \\ y' &= (\alpha_2 - \beta_2 y - \gamma_{21}x)y \end{cases} \quad (1)$$

où les constantes  $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_{12}$ , et  $\gamma_{21}$  sont supposées positives.

L'exemple suivant de dynamique de deux populations en compétition illustre ce que l'on appelle le *principe d'exclusion compétitive*. Voici son système différentiel et, plus bas, son champs de vecteurs :

$$\begin{cases} x' &= (1 - 0.5x - 0.33y)x \\ y' &= (1 - x - 0.5y)y \end{cases} \quad (2)$$

1. Calculer les coordonnées  $(x', y')$  du vecteur de ce champs de vecteurs situé au point  $A = (1, 0.5)$  et vérifier sa direction sur la figure. Même question pour celui du point  $B = (2, 1)$ .



2. Calculer les équations de deux droites qui sont les isoclines  $x' = 0$  du système (2).

