

NOM :
PRENOM :

Coripe

Date :
Groupe :

Mathématiques pour la Biologie : Feuille-réponses du TD 8
Représentation de variables statistiques à 1 et 2 dimensions

Exercice 1. (moyenne, variance) : Pour déterminer l'effet de nutriment sur la croissance de plants de haricots, on prépare deux jeux de 100 pots de terre, les premiers contenant un apport de nutriment (pots expérimentaux) et les seconds n'en contenant pas (pots de contrôle). On plante un haricot dans chaque pot et on mesure, après 20 jours, la taille des plants obtenus. Voici les 6 premières mesures de chaque lot (pour simplifier l'exercice, on ne prendra en compte que ces 6 mesures).

Contrôle	9,3	13,2	14,2	11,7	10,3	9,7
Expérimental	13,4	12,1	15,1	13,2	13,5	14,9

1. Calculer la moyenne μ_c et μ_e de chaque lot.

$$\mu_c = (9,3 + 13,2 + 14,2 + 11,7 + 10,3 + 9,7) / 6 = 11,4$$

$$\mu_e = (13,4 + 12,1 + 15,1 + 13,2 + 13,5 + 14,9) / 6 = 13,7$$

2. Calculer la variance Var_c et l'écart-type σ_c du lot de contrôle. Même question pour l'autre lot.

$$Var_c = \frac{1}{6} ((9,3 - \mu_c)^2 + (13,2 - \mu_c)^2 + \dots + (9,7 - \mu_c)^2) = 3,28 \text{ d'où } \sigma_c = \sqrt{Var_c} = 1,81$$

$$Var_e = \frac{1}{6} ((13,4 - \mu_e)^2 + (12,1 - \mu_e)^2 + \dots + (14,9 - \mu_e)^2) = 1,06 \text{ d'où } \sigma_e = \sqrt{Var_e} = 1,03$$

3. Pour chaque lot, indiquer combien de mesures sont dans l'intervalle $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$. Même question pour l'intervalle $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$.

$$[\mu_c - \sigma_c, \mu_c + \sigma_c] = [9,59 ; 13,21]$$


$$[\mu_c - 2\sigma_c, \mu_c + 2\sigma_c] = [7,78 ; 15,02]$$

$$[\mu_e - \sigma_e, \mu_e + \sigma_e] = [12,67 ; 14,73]$$


$$[\mu_e - 2\sigma_e, \mu_e + 2\sigma_e] = [11,64 ; 15,76]$$

qui contient **4** données sur les 6,
qui contient toutes les 6 données.
qui contient **3** données sur les 6


Exercice 2. (histogrammes) :




$\mu \approx 31$
 σ "petit" (C)



$\mu \approx 34$
 σ "grand" (A)



$\mu \approx 11$
 σ "grand" (D)



$\mu \approx 11$
 σ "petit" (B)

Associer à chaque histogramme le bon jeu de paramètres parmi les 4 jeux suivants : A : ($\mu = 34,285, \sigma = 2,89$), B : ($\mu = 11,095, \sigma = 0,96$), C : ($\mu = 31,095, \sigma = 0,96$) et D : ($\mu = 11,285, \sigma = 2,89$) en indiquant sous chaque dessin les valeurs sélectionnées.

Exercice 3. (covariance de deux séries) : Compléter les deux tableaux suivants (dans la dernière colonne, mettre la moyenne) et en déduire les valeurs de $Cov(x, y)$ et $Cov(x, z)$.


x_i	1	2	3	5	7	μ 3,6
y_i	3	2	1	1	0	1,4
$x_i y_i$	3	4	3	5	0	3

x_i	1	2	3	5	7	μ 3,6
z_i	2	4	1	3	5	3
$x_i z_i$	2	8	3	15	35	18,6


$$Cov(x, y) = \frac{1}{5} \sum x_i y_i - \mu_x \mu_y = 3 - (3,6)(1,4) = -2,04$$

$$Cov(x, z) = \frac{1}{5} \sum x_i z_i - \mu_x \mu_z = 18,6 - (3,6)(3) = 1,8$$

Tracer les deux nuages de points (x_i, y_i) et (x_i, z_i) et en déduire une justification des signes des covariances obtenues.



car $Cov(x, y) < 0$
d'où un nuage "descendant"



$Cov(x, z) > 0$
d'où un nuage "ascendant"

Exercice 4. (transformation de la variance par une application affine) :

- On considère la série des mesures de l'exercice 1 (que l'on note toujours x_i) et la série y_i qui en est une image par translation $y_i = x_i - \mu_x$ que l'on appelle série centrée. Compléter le tableau suivant et en déduire la variance de la série y_i .

x_i	9,3	13,2	14,2	11,7	10,3	9,7	μ 11,4
$y_i = x_i - \mu_x$	-2,1	1,9	2,8	0,3	-1,1	-1,7	0
y_i^2	4,41	3,61	7,84	0,09	1,21	2,89	3,24

l'espérance d'une série centrée est nulle.

$$Var(y) = \frac{1}{6} \sum y_i^2 - (\mu_y)^2 = 3,28 - (0)^2 = 3,28$$

- Comparer avec la variance des x_i calculée précédemment. Quelle propriété de la variance explique ce résultat ?

On observe que $Var(y) = Var(x) = Var(x)$ - On a vu en effet que
 (*) $Var(ax+b) = a^2 Var(x)$ (Ici $a=1$ et $b=-\mu_x$).
 La variance d'une série reste inchangée par une translation.



- On transforme à présent la série x_i en la série $z_i = \frac{1}{2}x_i$. Calculer la variance des z_i et la comparer avec celle des x_i . Commentez.

x_i	9,3	13,2	14,2	11,7	10,3	9,7	μ 11,4
$z_i = \frac{1}{2}x_i$	4,65	6,6	7,1	5,85	5,15	4,85	5,7
z_i^2	21,62	43,56	50,41	34,22	26,52	23,52	32,49

$$Var(z) = \frac{1}{6} \sum z_i^2 - (\mu_z)^2 = 33,31 - (5,7)^2 = 9,82$$

On applique la formule (*) avec $a=1/2$ (et $b=0$) : $0,82 = \frac{1}{4}(3,28)$

- Représenter les deux nuages de points (x_i, y_i) et (x_i, z_i) ainsi que leurs centres de gravité. Expliquer pourquoi ces deux nuages ont une forme particulière.



Comme $y_i = x_i - 11,4$, les points du nuage sont alignés sur la droite d'équation $y = x - 11,4$. De même ceux du nuage (x_i, z_i) sont alignés sur la droite d'équation $z = \frac{1}{2}x$.