

Université de Nice Sophia-Antipolis 2009 - 2010
L3 Mass. Calcul différentiel

Feuille TD 3 : Corrigé partiel

1. Question de cours.

A. Une fonction f , de \mathbb{R}^3 dans \mathbb{R} , est dite différentiable en un point $M_0 := (x_0, y_0, z_0)$ s'il existe une (unique) application linéaire $l = Df_{M_0}$, de \mathbb{R}^3 dans \mathbb{R} , telle qu'on puisse écrire au voisinage de ce point le développement limité de f à l'ordre 1 suivant :

$f(x, y, z) := f(M) = f(M_0) + Df_{M_0}(M - M_0) + \|M - M_0\| \theta(M),$
où $M - M_0 = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ est l'accroissement de (x, y, z) et où $\theta(M) \rightarrow 0$ quand $M \rightarrow M_0$.

Dans le cas où f est à valeurs dans \mathbb{R} , on peut représenter cette application linéaire $l = Df(M_0)$ par l'application :

$$V := (u, v, w) \rightarrow \langle \nabla f(M_0), V \rangle := \partial_x f_{M_0} u + \partial_y f_{M_0} v + \partial_z f_{M_0} w.$$

On écrit en abrégé: $l = Df_{M_0} = \nabla f(M_0)$: on assimile donc l'application linéaire l et le vecteur $\nabla f(M_0)$. Si on suppose que f admet des dérivées partielles $\partial f_x, \partial f_y$ et ∂f_z au point (x_0, y_0, z_0) , on ne peut pas en déduire qu'elle est différentiable en ce point, voir contre-exemple donné dans les Notes de Cours, p6.

B. Le lemme de Schwarz dit qu'une fonction f de classe C^2 de \mathbb{R}^2 dans \mathbb{R} a ses deux dérivées secondes mixtes égales.

2. Préciser la régularité et donner ensuite, si c'est possible, le gradient, la matrice Hessienne et le développement limité à l'ordre 2 à l'origine des fonctions suivantes

$$f(x, y) = \arctan(x + y^2), \quad g(x, y) = \ln(1 + xy).$$

a. La fonction f est définie et C^∞ sur \mathbb{R}^2 . Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on peut donc calculer ses dérivées partielles premières et secondes

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{1 + (x + y^2)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{1 + (x + y^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{-2 \cdot (x + y^2)}{(1 + (x + y^2)^2)^2}$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2 \cdot (1 + x^2 - 3y^4 - 2xy^2)}{(1 + (x + y^2)^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{-4y \cdot (x + y^2)}{(1 + (x + y^2)^2)^2}.$$

Le gradient et le DL2 en $(0, 0)$ existent (car $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$). Le gradient et la matrice Hessienne à l'origine sont respectivement donnés par

$$\nabla f(0, 0) = (1, 0) \quad \text{et} \quad H(f)(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

d'où le DL2 de f à l'origine :

$$f(x, y) = x + y^2 + \|(x, y)\|^2 \theta(x, y) \quad \text{avec} \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \theta(x, y) = 0$$

b. La fonction g est définie et C^∞ sur le domaine *ouvert*

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / xy > -1\}.$$

. Pour $(x, y) \in D$, on peut donc calculer ses dérivées partielles premières et secondes :

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial x} &= \frac{y}{1+xy}, & \frac{\partial g}{\partial y} &= \frac{x}{1+xy}, \\ \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} &= \frac{y^2}{(1+xy)^2}, & \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= \frac{x^2}{(1+xy)^2}, & \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} = \frac{1}{(1+xy)^2}. \end{aligned}$$

Le gradient et le DL2 en $(0, 0)$ existent (car $g \in C^2(D)$) et $(0, 0) \in D$ et on a

$$\nabla g(0, 0) = (0, 0) \quad \text{et} \quad H(f)(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

d'où le DL2 de g à l'origine :

$$g(x, y) = xy + \|(x, y)\|^2 \theta(x, y) \quad \text{avec} \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \theta(x, y) = 0.$$

Dans tout cet exercice, on a utilisé le théorème de Schwarz car les fonctions sont C^2 sur leur ensemble de définition.

3. Soit $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$. On suppose que

$$y \frac{\partial f}{\partial x} - x \frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

En utilisant la fonction annexe $F(\rho, \theta) = f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$, montrer que la fonction f est radiale, i.e. il existe $\varphi \in C^2(\mathbb{R}_+)$ telle que $f(x, y) = \varphi(\sqrt{x^2 + y^2})$. En d'autres termes, montrer que $f(x, y)$ ne dépend que de la distance de (x, y) à $(0, 0)$.

On pose donc $F(\rho, \theta) = f(x, y) = f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$. La fonction F est C^1 sur \mathbb{R}^2 comme composée de fonctions au moins C^1 . La fonction f sera radiale ssi f ne dépend que de $\sqrt{x^2 + y^2}$ ssi F ne dépend que de ρ . Comme F est C^1 , calculons sa dérivée par rapport à θ :

$$\frac{\partial F}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) (-\rho \cos \theta) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) (\rho \sin \theta),$$

avec $(x, y) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$

$$\frac{\partial F}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow F(\rho, \theta) = \varphi(\rho),$$

où $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction C^1 arbitraire. Comme $\varphi(\rho) = F(\rho, 0)$, on a $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$. Soient maintenant $x, y \in \mathbb{R}^2$. Soit ρ, θ tels que $x = \rho \cos \theta$ et $y = \rho \sin \theta$. Il vient alors

$$f(x, y) = F(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) = \varphi(\rho) = \varphi(\sqrt{x^2 + y^2}),$$

donc f est bien radiale.

4. En échangeant x et y , on se ramène à l'exercice suivant, donné en partiel une année précédente : Etudier la fonction $f(x, y) = x^2 \sin \frac{y}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0, y) = 0$. Est-elle de classe C^1 sur \mathbb{R}^2 ? Est-elle C^2 ?

Étudions d'abord la régularité de f en dehors de la droite $x = 0$: f est définie, continue, C^1 (elle admet des dérivées partielles et celles-ci sont continues, et même C^∞ en tout point de $\Omega = (\mathbb{R} - \{0\}) \times \mathbb{R}$), comme composée de fonctions définies, continues, C^1 , C^∞ sur les ensembles correspondants. Calculons ses dérivées premières en un point (x, y) quelconque. On a pour $x \neq 0$:

$$\partial_x f(x, y) = 2x \sin \frac{y}{x} - y \cos \frac{y}{x} \text{ et } \partial_y f(x, y) = x \cos \frac{y}{x}.$$

A titre d'illustration (non demandée dans l'exercice) on peut par exemple donner le DL1 de g au point $(1, \pi)$: on a donc $f(1, \pi) = 0$ et $\partial_x f(1, \pi) = -\pi \cos \pi = \pi$ et $\partial_y f(1, \pi) = \cos \pi = -1$. on a donc en ce point le DL à l'ordre 1 suivant :

$$f(x, y) = f(1, \pi) + Df_{(1, \pi)}(x - 1, y - \pi) + \|(x - 1, y - \pi)\|\theta(x, y),$$

où $\theta(x, y) \rightarrow 0$ quand $(x, y) \rightarrow (1, \pi)$,

et où $Df_{(1, \pi)}(x - 1, y - \pi) = \pi(x - 1) - (y - \pi)$.

Ensuite, étudions la régularité de f pour $x = 0$: d'abord pour tout (x, y) on a : $|f(x, y)| \leq x^2 \rightarrow f(0, 0) = 0$ quand $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, donc f est continue pour $x = 0$.

Par ailleurs, on vérifie directement en revenant à la définition que $\partial_x f(x, y)$ et $\partial_y f(x, y)$ existent et sont nulles pour $x = 0$ et pour tout y . En effet,

$$\begin{aligned} \partial_x f(0, y_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} (h^{-1}(f(h, y_0) - f(0, y_0))) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (h^{-1}(h^2 \sin(\frac{y_0}{h}) - 0)) = 0, \end{aligned}$$

et de même

$$\begin{aligned} \partial_y f(0, y_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} (h^{-1}(f(0, y_0 + h) - f(0, y_0))) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (h^{-1}(0 - 0)) = 0. \end{aligned}$$

Enfin, de même que pour la fonction f ,

$$|\partial_y f(x, y)| = |x \cos \frac{y}{x}| \leq |x| \rightarrow \partial_y f(0, y_0) = 0$$

quand $(x, y) \rightarrow (0, y_0)$, donc $\partial_y f(x, y)$ est continue au point $(0, y)$, pour tout y .

Étudions de même la continuité de $\partial_x f$ pour $x = 0$. On a :

$$\partial_x f(x, y) = 2x \sin \frac{y}{x} - y \cos \frac{y}{x}.$$

Le premier morceau tend vers 0 quand $(x, y) \rightarrow (0, y_0)$, car $|\sin \frac{y}{x}| \leq 1$.

Par contre, si $y_0 \neq 0$, le deuxième morceau n'a pas de limite, car $\sin \frac{y}{x}$ n'a pas de limite quand $(x, y) \rightarrow (0, y_0)$. Par contre, si $y_0 = 0$, alors $\partial_x f(x, y) \rightarrow \partial_y f(0, 0) = 0$ quand $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

Donc f est C^1 à l'origine, donc différentiable en ce point, avec une différentielle nulle, mais elle n'est pas C^1 pour $x = 0$ et $y \neq 0$. On peut donc en déduire (non demandé dans l'exercice) qu'elle admet donc à l'origine le DL à l'ordre 1 suivant :

$$f(x, y) = f(0, 0) + \|(x, y)\|\theta(x, y),$$

où $\theta(x, y) \rightarrow 0$ quand $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

5. voir corrigé oral.