

## Variables aléatoires à densité

### 1 Variance

1. Si  $X$  est une v.a. réelle à densité continue, montrez que l'écart type de  $X$  est non nul.
2. Démontrez l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev:  $P[|X - E(X)| \geq a > 0] \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2}$ .

### 2 Rencontre

Castor et Pollux projettent de se rencontrer entre 17h et 18h. Chacun d'eux a promis de ne pas attendre l'autre plus de 10 minutes. On suppose qu'ils arrivent indépendamment à des instants uniformément distribués entre 17h et 18h.

1. Calculez la probabilité d'une rencontre.
2. A présent, Castor fixe son heure d'arrivée à  $x$ . Quelle probabilité a-t-il de rencontrer Pollux?
3. Arrivant à l'heure  $x$ , Castor ne trouve personne. Quelle probabilité a-t-il de rencontrer Pollux?

### 3 Variables amnésiques

Soit  $T$  une v.a.r. strictement positive à densité continue sur  $]0, +\infty[$ . telle que, pour tout  $s > 0$  et  $t > 0$ :

$$P(T > t + s | T > t) = P(T > s).$$

Le but de cet exercice est de montrer que  $T$  suit une loi exponentielle.

1. Pourquoi  $P(T > 0) > 0$ ?
2. Vérifier que  $P(T > t + s) = P(T > t)P(T > s)$  pour tout  $t > 0$  et  $s > 0$ .
3. Montrez que  $\forall t > 0, P(T > t) > 0$ .
4. On définit alors l'application  $G(t) = P(T > t)$ .  
Calculer  $G(0)$ ,  $G$  sur  $] -\infty, 0]$ .  
Montrez que  $G$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$ , expliciter  $G$  et conclure.

### 4 Lois gammas

Pour  $a > 0, \lambda > 0$ , on pose  $\Gamma(a) := \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{a-1} dx$  et  $\gamma_{a,\lambda}(x) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} e^{-\lambda x} x^{a-1}$ , si  $x > 0$ ,  
 $\gamma_{a,\lambda}(x) = 0$  si  $x \leq 0$ . On appelle loi gamma  $G(a, \lambda)$  la loi de densité  $\gamma_{a,\lambda}$ .

1. Vérifiez que:  $\Gamma(\cdot)$  est bien définie, continue sur  $]0, +\infty[$ ,  $\Gamma(a + 1) = a\Gamma(a)$ ,  $\Gamma(n + 1) = n!$

2. Soit  $X$  une v.a. de loi  $G(a, \lambda)$ , calculez  $E(X)$ ,  $Var(X)$ .
3. \*\* Soit  $X, Y$  deux v.a. indépendantes de loi  $G(a, \lambda)$ ,  $G(b, \lambda)$ . Montrez que la loi de  $Z = X + Y$  est  $G(a + b, \lambda)$ . On pourra calculer  $E(\varphi(Z))$  à l'aide de la loi du couple  $(X, Y)$  et ramener l'intégrale double à une intégrale simple.
4. Si  $X_1, \dots, X_n$  sont  $n$  v.a. indépendantes de loi exponentielles de paramètre  $\lambda$ , donnez la loi de  $X_1 + \dots + X_n$ .
5. Si  $Y_1, \dots, Y_n$  sont  $n$  v.a. indépendantes de loi normale centrées réduites, montrez que  $Y_1^2$  suit la loi  $G(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ . En déduire la valeur de  $\Gamma(\frac{1}{2})$ .
6. Donnez la loi de  $Z := Y_1^2 + \dots + Y_n^2$ , et calculez  $E(Z)$ ,  $Var(Z)$ .

## 5 Pannes d'ampoules

On dispose d'un lot d'ampoules électriques identiques. On suppose que la durée de vie de chaque ampoule est une v.a.  $X$  qui suit une loi exponentielle de paramètre  $\lambda > 0$ . Pour les applications numériques, le temps est exprimé en heure, et  $\lambda := 10^{-3}$ ,  $T = 200$ ,  $\theta = 10^4$ .

1. Calculez la durée de vie moyenne de chaque ampoule.
2. Quelle est la probabilité pour qu'une ampoule s'éteigne avant une durée  $T$  de fonctionnement?
3. On branche 2 ampoules simultanément à un instant  $t_0 = 0$ .
  - (a) Quelle est la probabilité qu'à un instant  $T$ , les 2 ampoules soient encore allumées?
  - (b) Quelle est la probabilité qu'à un instant  $T$ , au moins l'une des 2 ampoules soit encore allumée?
  - (c) Quelle est la probabilité qu'à un instant  $T$ , les 2 ampoules soient éteintes?

On branche 10 ampoules simultanément à un instant  $t_0 = 0$ .

- (a) Quelle est la probabilité qu'à un instant  $T$ , toutes les ampoules soient encore allumées?
- (b) Quelle est la probabilité qu'à un instant  $T$ , toutes les ampoules soient éteintes?
4. On branche une première ampoule à un instant  $t_0 = 0$ . Dès que celle-ci meurt, on la remplace par une seconde ampoule. Quelle est la loi de probabilité du temps déclairement à l'aide de ces deux ampoules et quel est le temps moyen d'éclairage?
5. On opère de façon identique avec  $n$  ampoules. Quelle est la loi de probabilité du temps déclairement?
6. Soit  $\theta > 0$  fixé. On suppose qu'à un instant  $t_0 = 0$ , on branche la première ampoule. Dès qu'une ampoule meurt, on dit qu'il y a panne, on la remplace par une autre. Soit  $N$  le nombre de pannes durant le temps  $\theta$ . Quelle est la loi de probabilité de  $N$ ?